

What to do if you suspect EAB

Help the Oregon Department of Agriculture manage EAB by reporting what you see.

1. File a report with the Oregon Invasive Species Hotline, at <https://oregoninvasiveshotline.org/> or call 1-866-INVADER.
2. Include photos of the surrounding environment, the whole tree, and any signs, symptoms, or insects.
3. Take note of the exact location of your detection and include it in your report.
4. If you suspect you have found an adult or larval EAB, collect it in a crushproof container, label the container with the date and location, and put the container in a freezer.

Once you file a report, someone may contact you to ask questions about your detection or arrange a site visit. If you are unable to file a report yourself, give the information to a supervisor or other trusted person to report.

For more information

Oregon Forest Pest Detector Field Guide (EM 9127), Oregon State University Extension Service. <https://catalog.extension.oregonstate.edu/em9127>

Oregon Forest Pest Detector website: <http://pestdetector.forestry.oregonstate.edu/> (more information on EAB and other high-priority forest pests)

Signs and symptoms of EAB: (4) crown dieback; (5) sucker shoots; (6) S-shaped galleries; (7) bark splits; (8) woodpecker damage



- Galerías con forma de "S" debajo de la corteza
- Adultos visibles en el verano

Que debe hacer si sospecha la presencia de EAB

Ayude al Departamento de Agricultura de Oregon a controlar el EAB reportando sus observaciones.

1. Envíe un reporte a la línea directa de especies invasoras de Oregon, en: <https://oregoninvasiveshotline.org/>; o llame al 1-866-INVADER.
2. Incluya fotos de los tipos de ambientes que están a su alrededor, del árbol completo, de cualquier seña, síntoma o de los insectos.
3. Tome nota de la ubicación exacta de dónde lo detectó e inclúyalo en su报告.
4. Si sospecha que encontró un adulto o una larva de EAB, colectela en un recipiente que no se pueda aplastar, póngale una etiqueta con la fecha y la ubicación precisa, y ponga el recipiente en el congelador.

Una vez que haya enviado su reporte, alguien lo contactará para hacerle unas preguntas acerca de lo que detectó y arreglará una visita al sitio. Si a usted no le es posible enviar el reporte, por favor dé la información a un supervisor, o a alguien en quien usted confie que sí lo va a reportar.

Para más información

Oregon Forest Pest Detector Field Guide (EM 9127), Oregon State University Extension Service. <https://catalog.extension.oregonstate.edu/em9127>

Oregon Forest Pest Detector web página electrónica: <http://pestdetector.forestry.oregonstate.edu/> (para información adicional sobre el ALB y otras infestaciones forestales de alta prioridad)

Señales y síntomas del EAB: (4) muerte regresiva de la copa; (5) brotes basales que salen de la raíz o del tronco; (6) galerías en forma de "S"; (7) separación de la corteza; (8) daño causado por pájaros carpinteros

Funding provided by USDA-APHIS and the USDA Forest Service

Esta publicación fue financiada por USDA-APHIS y el Servicio Forestal del USDA



© 2022 Oregon State University. El trabajo de Extensión es un programa cooperativo entre Oregon State University, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y los condados de Oregon. El Servicio de Extensión de Oregon State University ofrece programas educativos, actividades y materiales sin discriminación en base a raza, color, origen nacional, religión, sexo, identidad de género (incluyendo expresión de género), orientación sexual, discapacidad, edad, estado civil, estatus de familia/padres, ingresos derivados de un programa de asistencia pública, creencias políticas, información genética, estado de veterano, o represalias por actividades anteriores de derechos civiles. (No todas estas categorías son aplicables a todos los programas.)

Published May 2017. Revised July 2022.

Oregon Forest Pest Detector Pest Watch

Emerald ash borer (EAB)

B. Saffell and A. Grotta

The emerald ash borer (EAB) is an invasive insect from Asia. It was first found in the United States in 2002. It has now spread across the eastern U.S. and as far west as Colorado, and has killed hundreds of millions of ash trees. EAB is spread primarily by the transport of nursery stock and firewood. EAB has been found in Oregon, and all ash trees in Oregon cities and forests are at risk. Once established, EAB is very difficult to control. By keeping an eye out for EAB, you can help protect trees and forests in Oregon.

Insect identification

Adult: 7.5 to 13.5 mm (0.3 to 0.5 inch) long, slender, and metallic olive to emerald green; active June through July

Larva: 2.6 to 3.2 cm (1 to 1.3 inches) long, creamy white, with bell-shaped segments; found under the bark throughout the year; causes damage to tree by eating tissue below the bark


Hosts

Ash (*Fraxinus spp.*) Ash in Oregon is primarily found in cities and towns as landscape trees and in natural riparian forests throughout the Willamette Valley.

White fringetree (*Chionanthus virginicus*)

Signs and symptoms

- Significant crown dieback in heavily infested trees (starts in top third of the crown)
- Sucker shoots emerging from the trunk or base of the tree
- Woodpecker activity that gives bark a distinct mottled appearance
- D-shaped holes in the bark about 3 mm (0.1 inch) in diameter
- Splitting bark
- S-shaped galleries underneath the bark
- Adults visible in summer



(1) Adult EAB, and actual size in top right corner; (2) EAB larva, and actual size in bottom left corner; (3) D-shaped exit hole
 (1) EAB adulto, y uno de tamaño real en la esquina derecha superior; (2) Una larva de EAB, y una larva de tamaño real en la esquina inferior izquierda; (3) Orificio de salida en forma de "D"

Monitoreo y Detección de Plagas Forestales en Oregon

El Barrenador verde Esmeralda del Fresno (EAB)

B. Saffell y A. Grotta

El Barrenador verde Esmeralda del Fresno (EAB) es una especie invasora de Asia. Fue descubierto por primera vez en los Estados Unidos en el 2002. Actualmente se ha propagado en los estados del este de EUA y hasta Colorado en el oeste matando cientos de millones de fresnos. El EAB se propaga principalmente cuando es transportado en plántulas de vivero y leña. Aún no se ha encontrado en Oregon, pero todos los fresnos en las ciudades y bosques están en alto riesgo. Una vez que el EAB se establece, es muy difícil de controlar. Si está atento y al cuidado del EAB, usted nos puede ayudar a proteger los árboles y bosques en Oregon.

Identificación del insecto

Adulto: de 7.5 a 13.5 mm (0.3 a 0.5 pulgada); de color verde esmeralda metálico; está activo de junio a julio

Larva: de 2.6 a 3.2 cm (1 a 1.3 pulgadas) de largo, es de apariencia blanca cremosa con segmentos en forma de campana; se pueden encontrar debajo de la corteza durante todo el año, dañando al árbol al alimentarse del tejido que se encuentra en esa zona

Hospederos

Fresno (*Fraxinus spp.*). En Oregon, el fresno se encuentra principalmente en las ciudades y pueblos como árbol ornamental, también se encuentran de manera natural en los bosques de las riberas a lo largo del Valle del Willamette.

Cionanto, Flor de Nieve o Barba de Viejo (*Chionanthus virginicus*)

Señales y síntomas

- Significante mortalidad de la copa en árboles muy infestados (comienza en el tercio superior de la copa)
- Brotes que emergen del tronco o de la raíz
 - Actividad de los pájaros carpinteros que le da un moteado distintivo a la corteza del árbol
 - Orificios con forma de "D" en la corteza de aproximadamente 3 mm (0.1 pulgada) de diámetro
 - Corteza partida